



# **ANTIBIÓTICO**

Vía tópica oral

#### Fórmula:

fusidato de sodio 2 g, excipientes c.s.p. 100 g

#### Fórmula:

ácido fusídico 2 g, p-hidroxibenzoato de metilo 0,05 g, excipientes c.s.p. 100 g

# Acción terapéutica:

**Afus**° contiene un antibiótico de uso tópico y está recomendado para el tratamiento de infecciones de la piel.

#### **Indicaciones:**

Afusº está indicado para el tratamiento de infecciones cutáneas causadas por estafilococos y estreptococos:

- impétigo y dermatosis impetiginizada, en el tratamiento local para formas localizadas de un pequeño número de lesiones o en el tratamiento local combinado con un tratamiento sistémico con antibiótico para formas más extensas.
- Desinfección de zonas microbianas cutáneo-mucosas, en portadores sanos de estafilococos y después de infecciones con estafilococos, concretamente forunculosis.

## Posología y modo de empleo:

Siga exactamente las instrucciones de uso indicadas por su médico. Consúltelo nuevamente si tiene dudas.

Usar **Afus® Crema** para lesiones maceradas e infiltrantes y pliegues cutáneos. No usar **Afus® Ungüento** para el tratamiento de lesiones maceradas e infiltrantes, pliegues cutáneos o úlceras en las piernas.

Aplicación local con o sin apósito, 1 ó 2 veces al día después de limpiar la superficie infectada. Evitar la aplicación de una capa gruesa. El tratamiento en general se limita a 1 semana o según prescripción médica.

Se recomienda lavarse las manos correctamente con agua y jabón, antes y después de masajear la zona afectada.

#### Reacciones adversas:

Las reacciones adversas que han sido reportadas son:

- Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):
  - reacciones cutáneas locales (incluyendo dermatitis de contacto y eccema),
  - erupción cutánea (rash),
  - picazón, enrojecimiento de la piel (eritema),
  - dolor en el lugar de aplicación (incluyendo sensación de guemazón), irritación en el lugar de



J.X.

aplicación.

- Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):
  - reacciones alérgicas,
  - conjuntivitis,
- hinchazón de cara/garganta,
- urticaria,
- ampollas en la piel.

#### **Precauciones:**

Se ha comunicado la aparición de cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes al ácido fusídico por vía tópica.

Así como todas las preparaciones con antibióticos tópicos su uso prolongado puede aumentar el riesgo de resistencia al antibiótico y de sensibilización por contacto.

Este medicamento no se debe aplicar en los ojos ni en la superficie interior de los párpados.

Se debe evitar la reabsorción y paso a vía sistémica del antibiótico en caso de lesiones epidérmicas extensas y úlceras en las piernas.

**Afus®** Crema contiene alcohol cetoestearílico y BHT como excipientes, los cuales pueden causar reacciones locales (por ejemplo dermatitis de contacto).

## Embarazo y lactancia:

Este medicamento puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, debiéndose evitar la aplicación sobre las mamas durante el período de lactancia.

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

### **Contraindicaciones:**

No utilizar este medicamento si es alérgico al ácido fusídico o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

#### **Interacciones medicamentosas:**

Las interacciones con medicamentos de administración sistémica se consideran mínimas ya que la absorción sistémica del principio activo por vía tópica es insignificante.

### **Advertencias:**

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños. En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel.: 1722.

#### Conservación:

Conservar el pomo bien tapado, a temperatura ambiente entre 15° y 25° C.

### **Presentaciones:**

Afus® Ungüento y Crema: Envases conteniendo 15 g.



Estero Bellaco 2782 - Montevideo Industria Uruguaya **Contacto:** 24872450 - atencionalcliente@efa.com.uy www.efalaboratorios.com.uy

131336