

daflon® 500

Diosmina 450 mg
Hesperidina 50 mg

Comprimidos recubiertos

Vía oral

VENOTONICO - VASCULOPROTECTOR

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, o no está seguro de alguna cosa, consulte a su médico.
- Este medicamento se lo han recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas, puede perjudicarlas, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.
- Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, informe a su médico.

Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Fracción flavonoide purificada y micronizada: 500 mg equivalentes a:

Diosmina: 450 mg

Flavonoides expresados en Hesperidina: 50 mg

Excipientes c.s.

Contenido del prospecto:

1. Qué es **DAFLON® 500 mg** y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar **DAFLON® 500 mg**.
3. Cómo tomar **DAFLON® 500 mg**.
4. Reacciones adversas.
5. Advertencias.
6. Conservación.
7. Presentaciones.

1. QUÉ ES DAFLON® 500 mg Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

Este fármaco es un venotónico (aumenta la tonicidad de las venas) y un vasculoprotector (aumenta la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos).

Se utiliza en el tratamiento de:

- Trastornos de la circulación venosa (piernas pesadas, dolores, piernas inquietas (necesidad imperiosa de mover las piernas que aparece especialmente en la posición acostada)).
- Crisis hemorroidales.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR DAFLON® 500 mg:

No tome **DAFLON® 500 mg**:

Contraindicaciones:

Si es alérgico (hipersensible) a las fracciones flavonoides purificadas y micronizadas, especialmente a la Diosmina (o a la Hesperidina) o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Tenga especial cuidado con DAFLON® 500 mg:

Precauciones:

- Si toma este medicamento para crisis hemorroidales y los trastornos persisten durante más de 15 días, es indispensable consultar a su médico.
- Si toma este medicamento para trastornos de la circulación venosa (en particular la sensación de piernas pesadas) también debe asegurarse de:
 - tener un estilo de vida saludable,
 - evitar la exposición al sol, al calor,
 - no permanecer de pie por mucho tiempo,
 - evitar el sobrepeso.

El caminar y eventualmente el uso de medias o calcetines de compresión favorecen la circulación sanguínea.

Toma de otros medicamentos:

Interacciones medicamentosas:

Comuníquese a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

DAFLON 500



132245



Alimentos y bebidas:

No se describen interacciones.

Embarazo y lactancia:

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo:

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de **DAFLON® 500** durante el embarazo.

Lactancia:

No se recomienda la lactancia durante el tratamiento debido a la ausencia de datos sobre el pasaje del medicamento a la leche materna.

3. CÓMO TOMAR DAFLON® 500 mg:

Posología y forma de administración:

Respete en todo momento la posología indicada por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas.

La dosis usual es de 2 comprimidos por día.

Si toma este medicamento por una crisis hemorroidal, la dosis usual es de 6 comprimidos al día los primeros 4 días y a continuación 4 comprimidos al día

durante los siguientes 3 días. Los comprimidos se tragan con un vaso de agua.

Frecuencia de administración: al mediodía y por la noche con las comidas.

Duración del tratamiento:

Si toma este medicamento para crisis hemorroidales y los trastornos persisten durante más de 15 días, es indispensable consultar a su médico.

Si toma más DAFLON® 500 del que debiera:

Sobredosificación:

Si ha tomado más **DAFLON® 500** del que debiera, consulte inmediatamente con un médico o al C.I.A.T. Tel.: 1722.

Si bien la experiencia de sobredosis con **DAFLON® 500** es limitada, los síntomas notificados incluyen: diarrea, náuseas, dolor abdominal, prurito y erupción.

Si olvidó tomar DAFLON® 500 mg:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

4. REACCIONES ADVERSAS:

Al igual que todos los medicamentos, **DAFLON® 500 mg** puede producir reacciones adversas, aunque no todas las personas los sufran.

La frecuencia de las reacciones adversas indicadas a continuación se define usando el siguiente sistema:

- muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas),
- frecuentes (pueden afectar de 1 a 10 de cada 100 personas),
- poco frecuentes (pueden afectar de 1 a 10 de cada 1,000 personas),
- raras (pueden afectar de 1 a 10 de cada 10,000 personas),
- muy raras (pueden afectar a menos de 1 de cada 10,000 personas),
- frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Pueden incluir:

Frecuentes: diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos.

Poco frecuentes: colitis.

Raras: sensaciones vertiginosas, dolor de cabeza, malestar, erupción, prurito, urticaria.

Frecuencia no conocida: dolor abdominal; edema aislado de la cara, de los párpados, de los labios. Excepcionalmente edema de Quincke.

Si experimenta reacciones adversas que no aparecen en este prospecto, o si algunas de las reacciones adversas se vuelven graves, consulte a su médico.

5. ADVERTENCIAS:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.

En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel.: 1722.

6. CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

7. PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 20, 30 ó 60 comprimidos recubiertos.

Importado y acondicionado por:

EFA LABORATORIOS

Estero Bellaco 2782 - Montevideo

www.efalaboratorios.com.uy

Representante de **Les Laboratoires Servier**, Suresnes, Francia



Fabricante:

Les Laboratoires Servier Industrie - 45520 Gidy - Francia

