

XYLO-EFA® VISCOSA

Lidocaína clorhidrato 2%

Solución ANESTÉSICO LOCAL VÍAS ORAL Y TÓPICA BUCAL USO ADULTO Y PEDIÁTRICO

FÓRMULA:

Lidocaína clorhidrato: 2 g
p-Hidroxibenzoato de metilo: 0,07 g
p-Hidroxibenzoato de propilo: 0,03 g
Excipientes c.s.p 100 mL

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La Lidocaína es un anestésico local de tipo amida el cual produce una inhibición reversible en la generación y transmisión de impulsos nerviosos.
La Lidocaína es rápidamente absorbida por las membranas mucosas.

INDICACIONES Y USOS:

XYLO-EFA® Viscosa se emplea en procesos inflamatorios de las mucosas bucales y faríngeas. Elimina temporalmente el dolor de aftas, ulceraciones y/o quemaduras de las vías digestivas altas. También es empleada para prevenir el dolor y la incomodidad durante procedimientos médicos (esofagoscopia, etc.)

POSOLÓGIA Y MODO DE EMPLEO:

Utilizar según prescripción médica.

- Para dolores en la boca:

• Bebés y niños de hasta 3 años: aplicar 2 ó 3 gotas por vez, repitiendo si es necesario 3 ó 4 veces en el día como máximo, no realizando la siguiente aplicación hasta por lo menos 3 horas después de la última.

Muy importante: No sobrepasar en ningún caso la dosis y la frecuencia de aplicación prescritas. Capacitar muy especialmente a las personas que quedan al cuidado de bebés y niños sobre la importancia de cumplir estrictamente con la dosis y frecuencia indicadas.

• Niños mayores de 3 años: Aplicar de 3 a 5 gotas por vez, repitiendo si es necesario 3 ó 4 veces en el día como máximo.

En caso de ser necesario el producto se puede distribuir con la ayuda de un hisopo.

• Adultos: Distribuir por la boca 15 mL (medidos con la copa dosificadora llena al ras) durante 30 segundos para luego desecharla. No se debe volver a administrar antes de transcurridas 3 horas de la última aplicación, y no se debe emplear más de 3 ó 4 veces al día.

- Para molestias esofágicas y gástricas ingerir 10 mL o 15 mL (medidos con la copa dosificadora al ras) hasta 3 veces al día, enjuagar enseguida la boca varias veces con agua.

- Para la esofagoscopia hacer previamente un buche con 10 o 15 mL distribuyéndolo cuidadosamente por la boca y tragar luego lentamente sin enjuagar con agua.

REACCIONES ADVERSAS:

Recurrir al médico tan pronto como sea posible en caso de sentirse mal luego de una administración de XYLO-EFA® Viscosa.

Las reacciones adversas en general son producidas por altos niveles plasmáticos causados por el empleo de una dosis excesiva, una rápida absorción o como resultado de hipersensibilidad, idiosincrasia o tolerancia disminuida por parte del paciente.

Las reacciones adversas severas son de naturaleza sistémica e incluyen:

- En el Sistema Nervioso Central, las manifestaciones son excitatorias y/o depresoras, caracterizadas por: aturdimiento, parestesia peribucal, aprensión, euforia, confusión, mareos, somnolencia, hiperacusia, zumbidos en los oídos, visión borrosa, vómitos, sensación de calor, frío o entumecimiento, espasmos, temblores, convulsiones, pérdida de la conciencia, depresión y paro respiratorio.

La somnolencia es un síntoma de altas concentraciones plasmáticas de Lidocaína como consecuencia de una rápida absorción.

- En el Sistema Cardiovascular, las manifestaciones son generalmente depresoras, caracterizadas por: bradicardia, hipotensión, arritmia y colapso cardiovascular que puede llevar a paro cardíaco.

- Las reacciones alérgicas se caracterizan por: lesiones cutáneas, urticaria, edema o en los casos más severos shock anafiláctico.

SOBREDOSIFICACIÓN:

En el caso de sospechar la existencia de una sobredosificación -incluso si aún no se presentan síntomas de la misma- se requiere atención médica urgente.

Los primeros signos de sobredosis son adormecimiento de los labios y alrededor de la boca, sensación

de desmayo, mareos y visión borrosa.

En el caso de una sobredosis grave se pueden producir convulsiones, temblores y puede ocurrir posteriormente inconsciencia.

Las sobredosificaciones graves si no son tratadas rápidamente pueden llevar a la muerte.

PRECAUCIONES:

XYLO-EFA® Viscosa no está recomendada para aliviar el dolor de la dentición en bebés y niños. Debe ser utilizada con precaución en niños menores de 2 años ya que no existen datos suficientes para garantizar la seguridad y eficacia del producto, el empleo en estos pacientes debe estar limitado a cuando las alternativas más seguras hayan fallado o no estén disponibles.

El uso en cantidades superiores a las indicadas, o la aplicación a intervalos de tiempo menores entre las dosis pueden provocar un aumento en la concentración plasmática de Lidocaína o sus metabolitos causando serias reacciones adversas.

La absorción en superficies lastimadas y en membranas mucosas es muy variable pero es especialmente alta en el árbol bronquial, pudiendo aumentar rápidamente y en forma excesiva la concentración plasmática y por lo tanto elevan el riesgo de la aparición de síntomas tóxicos como convulsiones.

Tener precaución al manejar u operar maquinaria luego de haber utilizado XYLO-EFA® Viscosa, ya que puede provocar somnolencia o lentitud de reflejos.

Evitar el contacto con los ojos.

Antes de utilizar XYLO-EFA® Viscosa informe a su médico si:

- está tomando otros medicamentos,
- ha tenido reacciones alérgicas previas a Lidocaína u otros anestésicos,
- tiene una infección o herida cercanas a la zona en la que se empleará el producto,
- tiene serios problemas hepáticos, renales o cardíacos,
- tiene epilepsia,
- alguien en su familia tiene porfiria,
- ha tenido shock severo.

Embarazo:

Categoría B, no se espera que cause daño al feto. Indique a su médico si está embarazada o si planea estarlo para que éste evalúe la relación riesgo/beneficio del empleo del producto.

Lactancia:

La Lidocaína es excretada por la leche materna, pero los efectos que puede provocar en el bebé son desconocidos, por lo tanto debe ser administrado con precaución y bajo la responsabilidad del médico tratante.

Parto:

Debe tenerse en cuenta la cantidad total de Lidocaína empleada si se utilizan otras preparaciones que la contengan.

Ancianos:

Son pacientes más sensibles a los efectos sistémicos debido al aumento de los niveles sanguíneos de Lidocaína después de dosis repetidas, por lo que se puede requerir reducir la dosis.

CONTRAINDICACIONES:

Su empleo está contraindicado en pacientes con conocida hipersensibilidad a los anestésicos locales de tipo amida y a los conservadores p-hidroxibenzoato de metilo y p-hidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Debe administrarse con precaución a pacientes que utilicen:

- Medicamentos que pueden afectar el ritmo cardíaco: amiodarona, mexiletina, procainamida, quinidina, sotalol y antibióticos macrólidos (eritromicina).
- Medicamentos que causan somnolencia: ciertos antihistamínicos (difenhidramina), anticonvulsivantes (carbamazepina), medicamentos para el sueño o la ansiedad (alprazolam, diazepam, zolpidem), relajantes musculares, analgésicos narcóticos (codeína), medicamentos de uso en psiquiatría (risperidona, clorpromazina, amitriptilina).

ADVERTENCIAS:

Este medicamento contiene Sacarina sódica.

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.

En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel.: 1722.

CONSERVACIÓN:

Conservar el frasco bien tapado a temperatura ambiente entre 15° y 25°C.

PRESENTACIONES:

Envase conteniendo un frasco gotero de 20 mL.

Envase conteniendo un frasco de 100 mL con una copa dosificadora.

Es un producto:

EFA LABORATORIOS 

Estero Bellaco 2782 - Montevideo

www.efalaboratorios.com.uy

Industria uruguaya

CONTACTENOS!
Tel: 2487 2450
E-mail: atencioncliente@efa.com.uy



129924

