

# Efaderm® K

Hidrocortisona acetato - Ketoconazol

## CREMA

**ANTIINFLAMATORIO - ANTIMICOTICO**

Vía tópica dérmica

### Fórmula:

Hidrocortisona acetato: 1 g;

Ketoconazol: 2 g;

p-Hidroxibenzoato de metilo: 0,08 g;

Excipientes c.s.p. 100 g.

### Propiedades farmacológicas:

Antiinflamatorio y antimicótico de uso tópico, adecuado para zonas de piel fina.

### Indicaciones:

Tratamiento de dermatosis inflamatorias secundariamente infectadas por hongos o levaduras sensibles al Ketoconazol.

### Forma de aplicación y posología:

Aplicar sobre la zona afectada una capa fina de **Efaderm® K** y extenderla friccionando suavemente para lograr una mejor penetración. Cuando se utiliza en pliegues, es importante que la zona esté seca, se recomienda eliminar la humedad con secador de cabello antes de aplicar el producto.

Como guía general aplicar el producto 1 ó 2 veces al día o según prescripción médica. Si en el período indicado por el médico no observa mejoría, consúltelo nuevamente.

### Reacciones adversas:

En **Efaderm® K**, por contener un corticoide de baja potencia y concentración, las reacciones adversas se encuentran reducidas al mínimo.

Cuando el tratamiento es muy prolongado o con el uso de vendajes oclusivos, pueden ocurrir: picazón, quemazón, hinchazón, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración de la piel, infecciones secundarias, atrofia de piel, estrías y miliaria.

### Precauciones:

Salvo indicación médica no es conveniente aplicarlo en áreas de piel atrófica.

Las aplicaciones en la cara se limitarán al menor tiempo posible. En caso de sobreagregarse infecciones bacterianas o virales, debe discontinuarse su uso y consultar al médico tratante.

Si por su empleo se produjera sensibilización, se debe interrumpir el tratamiento.

Es un producto de uso externo, evitar el contacto con los ojos. No utilizar en piel agrietada. Se debe tener cuidado al colocar la crema en la zona peri-orbital según prescripción médica, ya que puede producirse aumento de la presión intraocular o glaucoma.

No debe utilizarse con vendajes oclusivos debido al posible aumento de la absorción y por lo tanto una posible supresión del eje hipotalámico-pituitario-adrenal.

**Embarazo:** Categoría C. Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos para el feto. No debe ser utilizado sin indicación médica.

**Lactancia:** No existe información sobre sus efectos. Es responsabilidad del médico tratante tomar la decisión de discontinuar el amamantamiento o suspender el uso de la crema.

### Uso en niños:

No ha sido establecida la seguridad y eficacia de su empleo en niños, por lo cual el producto no debe administrarse en niños.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto. Afecciones cutáneas tuberculosas o sifilíticas, dermatosis asociada a vacunación, acné, herpes simple y otras virosis cutáneas, infecciones bacterianas, rosácea.

### Sobredosificación:

La utilización de cantidades superiores a las recomendadas aumenta el riesgo de efectos adversos. En el caso de sobredosificación crónica o aguda pueden aparecer efectos sistémicos, ante lo cual la administración de corticoesteroides tópicos se debe disminuir en forma gradual bajo la supervisión médica.

### Advertencias:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.

En caso de intoxicación recurrir al CIAT Tel. 1722.

### Conservación:

Conservar el pomo bien tapado, a temperatura ambiente entre 15° y 25°C.

### Presentación:

Pomos conteniendo 15 g.

**EFA** Laboratorios

Estero Bellaco 2782 - Montevideo  
Industria Uruguaya

**Contacto:** 24872450 - [atencionalcliente@efa.com.uy](mailto:atencionalcliente@efa.com.uy) - [www.efalaboratorios.com.uy](http://www.efalaboratorios.com.uy)

