

Efatracina®

Bacitracina 500 UI/g

UNGÜENTO OFTÁLMICO

ANTIBIÓTICO

Vía ocular

Fórmula:

Bacitracina.....	50.000 UI
p-Hidroxibenzoato de metilo:	50 mg
Excipientes c.s.p.:	100 g

Acción terapéutica:

La Bacitracina, principio activo de **Efatracina® Ungüento Oftálmico**, es un antibiótico de la familia de los Polipéptidos, que producen excelentes resultados cuando es utilizado en una formulación de uso oftálmico.

El espectro de acción de Bacitracina abarca fundamentalmente las bacterias Gram positivas patógenas tales como:

- Estafilococos en general y en forma especial el METICILINO RESISTENTE ocupando uno de los primeros lugares en la lista de antibióticos que actúan sobre dicha variedad de Estafilococo.
- Estreptococos, particularmente los del grupo A.

En el caso de las bacterias Gram negativas su efecto es muy reducido.

Bacitracina raramente produce resistencia bacteriana, pero, alguna cepa de Estafilococo fue detectada como resistente.

Indicaciones:

Procesos infecciosos producidos por microorganismos sensibles a la Bacitracina radicados en la zona ocular externa o interna tales como: conjuntivitis, blefaritis, orzuelos, etc.

Posología y modo de empleo:

Lave cuidadosamente sus manos antes de utilizar el ungüento oftálmico.

Cuando el área afectada es:

- La mucosa lacrimal: se colocará una fina película del ungüento sobre la parte interna del párpado, luego realizar 3 o 4 parpadeos para lograr que el mismo se extienda. Incluso se puede cerrar el ojo y masajear exteriormente el párpado suavemente.
- Externa: aplicar el ungüento de la misma forma ya explicada y extenderlo por medio de un trozo de gasa estéril o con la yema de un dedo de la mano luego de lavarse correctamente la misma.

Las aplicaciones se realizarán de 1 a 3 veces al día de acuerdo a la severidad del proceso o según indicación médica.

No toque el pico aplicador ni lo coloque directamente sobre el ojo. El pico contaminado podría infectar su ojo.

El ungüento es estéril mientras el pomo está sin abrir.

Reacciones adversas:

La Bacitracina tiene una baja incidencia en producir reacciones alérgicas, pero si ocurrieran se pueden manifestar como: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Si usted presenta alguno de estos síntomas concurra o contacte a una emergencia médica.

Precauciones:

El ungüento oftálmico no debe ser utilizado en infecciones oculares profundas o cuando pueda existir una infección sistémica.

El uso prolongado de antibióticos puede provocar el desarrollo de infecciones por microorganismos no susceptibles, particularmente por hongos.

Embarazo y lactancia:

Avise a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se conoce si la Bacitracina administrada por vía ocular es excretada por la leche materna.

Efatracina
UO



En ambos casos el médico tratante deberá evaluar la relación riesgo/beneficio para su utilización.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la Bacitracina o a algún componente del ungüento.

Advertencias:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.

En caso de intoxicación recurrir al CIAT, Tel.:1722.

Conservación:

Conservar el pomo bien tapado entre 15°C y 25°C.

No usar después de 30 días de abierto el pomo.

Presentación:

Pomos para uso oftálmico conteniendo 3 gramos de ungüento estéril.

 **Laboratorios**

Estero Bellaco 2782 – Montevideo

Industria Uruguaya

Contacto: 24872450 – atencionalcliente@efa.com.uy

www.efalaboratorios.com.uy