Triplixam® comprimidos recubiertos con película contiene Sodio
Triplixam® contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, es decir, esencialmente "exento de sodio".

3.Cómo tomar TRIPLIXAM®:

Posología y modo de empleo:

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.
En caso de duda, consulte nuevamente a su médico.
Trague el comprimido con la ayuda de un vaso de agua preferentemente por la mañana y antes del desayuno.
Su médico decidirá la dosis correcta para usted.
La dosis normal es de 1 comprimido diario.

Si toma más Triplixam® del que debe:

Sobredosificación:

La toma de demasiados comprimidos, puede ocasionar una presión arterial baja o incluso peligrosamente baja, algunas veces asociada con náuseas, vómitos, calambres, mareo, tendencia al sueño, confusión mental, oliguria (menor frecuencia de micción de lo normal), anuria (producción nula de orina o de micción). Puede sentirse ligeramente mareado, con sensación de desmayo o débil. Si la disminución de la presión arterial es grave, incluso puede causar un shock. Podría notar la piel fría y húmeda y podría perder la conciencia. El exceso de líquido puede acumularse en los pulmones (edema pulmonar) causando dificultad para respirar que puede desarrollarse hasta 24-48 horas después de la ingesta. Si ingiere demasiados comprimidos de **Triplixam®** busque asistencia médica inmediatamente.

Si olvidó tomar Triplixam®:
Es importante tomar este medicamento cada día, ya que un tratamiento continuo es más eficaz. Sin embargo, si olvidó tomar una dosis de **Triplixam®** tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Triplixam®:
Como el tratamiento para la hipertensión arterial normalmente es de por vida, debe hablar con su médico antes de dejar de tomar este medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico.

4.Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir reacciones adversas, aunque no todas las personas las sufran.

Interrumpa el tratamiento con este medicamento y acuda inmediatamente a su médico si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos que pueden ser graves:
- silbidos repentinos al respirar, dolor en el pecho , falta de aire o dificultad para respirar (poco frecuentes) (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas),
- hinchazón de los párpados, cara o labios (poco frecuentes) (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas),
- hinchazón de la boca, lengua o garganta, que causa gran dificultad para respirar (poco frecuentes) (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas),
- reacciones graves de la piel que incluyen erupción cutánea intensa, habones, enrojecimiento de la piel por todo el cuerpo, picazón intensa, formación de ampollas, descamación e inflamación de la piel, inflamación de las membranas mucosas (síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica) u otras reacciones alérgicas (muy raras) (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas),
- fuertes mareos o desmayos, (frecuentes) (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas),
- ataque al corazón (muy raras) (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas), latido cardíaco irregular con amenaza vital (frecuencia no conocida),
- inflamación del páncreas que puede causar dolor abdominal grave y dolor de espalda acompañado de gran sensación de malestar (muy raros) (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas).
- debilidad, calambres o dolor musculares o dolor muscular a la palpación y, en particular, si al mismo tiempo se siente mal o tiene fiebre alta (esto puede ser debido a la destrucción anormal del músculo) (frecuencia no conocida).

En orden decreciente de frecuencia, las reacciones adversas pueden incluir:
- Muy frecuentes: (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): edema (retención de líquidos),
- Frecuentes: (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): Niveles bajos de potasio en sangre, dolor de cabeza, mareo, palpitaciones (sentir los latidos del corazón), enrojecimiento, vértigos, hormigueo, alteraciones de la vista, visión doble, acúfenos (sensación de ruidos en los oídos); sensación de mareo leve debido a una presión arterial baja, tos, dificultad para respirar, trastornos digestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones del gusto, dispepsia o dificultad para la digestión, diarrea, estreñimiento, cambios del hábito intestinal), reacciones alérgicas (como erupciones cutáneas, picazón), espasmos musculares, sensación de cansancio, debilidad, somnolencia, hinchazón de tobillos.
- Poco frecuentes: (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): cambios de humor, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, temblor; habones; desmayo; pérdida de la sensación de dolor; latido cardíaco irregular o rápido; rinitis (nariz congestionada o con secreción); pérdida de cabello; púrpura puntos rojos en la piel); decoloración de la piel, picazón de la piel, sudoración; dolor en el pecho, dolor muscular o de articulaciones, dolor de espalda, sensación de malestar; problemas de riñón, trastornos de la micción, aumento de la necesidad de orinar durante la noche, aumento del número de

veces de orinar; impotencia (incapacidad para tener o mantener una erección); fiebre o temperatura alta; incomodidad o aumento de las mamas en los hombres; aumento o pérdida de peso; aumento de un tipo de células blancas sanguíneas, niveles altos de Potasio en sangre, hipoglucemia (niveles muy bajos de azúcar en sangre), niveles bajos de Sodio en sangre que puede provocar deshidratación y tensión arterial baja; vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos); reacciones de fotosensibilidad (cambio en el aspecto de la piel) tras la exposición solar o a la radiación UVA artificial, formación de ampollas en la piel; hinchazón de las manos o pies; elevación de la urea sanguínea y elevación de la creatinina en sangre; caídas; boca seca.
- Raras: (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): Estados de confusión; cambios en los resultados analíticos: niveles bajos de cloruro en sangre, niveles bajos de magnesio en sangre, aumento del nivel de enzimas hepáticas, nivel alto de bilirrubina sérica, empeoramiento de la psoriasis, disminución o ausencia de orina, insuficiencia renal aguda. Orina oscura, náuseas o vómitos, calambres musculares, confusión y convulsiones. Estos pueden ser síntomas de un trastorno denominado SIHAD (secreción inadecuada de hormonas antidiurética).
- Muy raras: (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): descenso en el número de células blancas sanguíneas, descenso en el número de plaquetas (que causa la fácil aparición de hematomas y de hemorragia nasal), anemia (disminución de los glóbulos rojos); [angina de pecho (dolor en el pecho, en la mandíbula y en la espalda, producidos por el esfuerzo físico y debidos a problemas del flujo sanguíneo al corazón)]; neumonía eosinofílica (un tipo raro de neumonía); inflamación de las encías; reacciones graves de la piel que incluyen erupción cutánea intensa, enrojecimiento de la piel por todo el cuerpo, picazón intensa, formación de ampollas, descamación e inflamación de la piel, eritema multiforme (erupción cutánea que a menudo comienza con manchas rojas que pican en la cara, brazos o piernas); encías sangrantes, sensibles o agrandadas; función anormal del hígado, inflamación del hígado (hepatitis); problemas graves de riñón, coloración amarillenta de la piel (ictericia); hinchazón abdominal (gastritis); trastorno en los nervios que puede causar debilidad, hormigueo o entumecimiento; aumento de la tensión muscular; hiperglucemia (nivel muy alto de azúcar en la sangre); aumento de los niveles de calcio en sangre; accidente cerebrovascular provocado posiblemente por una disminución excesiva de la presión arterial.
- Frecuencia no conocida: (no puede estimarse la frecuencia a partir de los datos disponibles): encefalopatía hepática (enfermedad del cerebro causada por una enfermedad del hígado; trazado anormal del ECG cardíaco, si sufre un lupus eritematoso sistémico (un tipo de enfermedad del colágeno) puede agravarse. Cortedad de vista (miopía), visión borrosa, disminución de la visión o dolor en los ojos debido a una presión elevada (signos posibles de acumulación de líquido en la capa vascular del ojo [derrame coroideo] o glaucoma agudo de ángulo cerrado).
  Temblor, rigidez postural, rigidez en la cara similar a una máscara, movimientos lentos y desequilibrio en la marcha con arrastre de los pies. Cambio de color, entumecimiento y dolor en dedos de manos o pies (fenómeno de Raynaud).

Como pueden aparecer cambios en los resultados de los análisis de sangre, su médico puede prescribirle análisis de sangre para controlar su estado.
Si desarrolla estos síntomas, contacte a un médico lo antes posible.
Si experimenta cualquier tipo de reacción adversa, consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en este prospecto.
Mediante la comunicación de reacciones adversas, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5.Advertencias:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.
En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel.: 1722.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el estuche y en el envase de comprimidos.
La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

6.Conservación:

Conservar el envase bien cerrado y a temperatura ambiente inferior a 30°C.
La estabilidad durante el uso después de la primera apertura del envase de 30 comp. es de 30 días. La estabilidad durante el uso después de la primera apertura del envase de 15 comp. es de 15 días.

7.Presentaciones:

TRIPLIXAM® 5 mg/1,25 mg/5 mg: envases conteniendo 15 y 30 comprimidos.
TRIPLIXAM® 10 mg /2,5 mg/5 mg: envases conteniendo 15 y 30 comprimidos.
TRIPLIXAM® 10 mg /2,5 mg/10 mg: envases conteniendo 15 y 30 comprimidos.

Importado y acondicionado por:
EFA Laboratorios
Estero Belloco 2762 - Montevideo
Industria Uruguaya
Contacto: 24872450 - atencionalcliente@efa.com.uy
www.efalaboratorios.com.uy

Representante de **Les Laboratoires Servier,** Suresnes, Francia
SERVIER

Fabricante:
Servier Industries Ltd. Gorey Road - Arklow Co. Wicklow - Irlanda

136336

TRIPLIXAM® 5mg/1.25mg/5mg
Comprimidos recubiertos — Perindopril Arginina / Indapamida/ Amlodipino

TRIPLIXAM® 10mg/2.5mg/5mg
Comprimidos recubiertos — Perindopril Arginina / Indapamida/ Amlodipino

TRIPLIXAM® 10mg/2.5mg/10mg
Comprimidos recubiertos — Perindopril Arginina / Indapamida/ Amlodipino

Vía oral
ANTIHIPERTENSIVO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta reacciones adversas consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en este prospecto, ver sección 4

TRIPLIXAM® 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg
Son comprimidos recubiertos blancos, oblongos, grabados con en una cara y con 2 en la otra cara.
Fórmula:
Perindopril arginina: 5 mg (equivalentes a 3,395 mg de Perindopril);
Indapamida: 1,25 mg;
Amlodipino: 5 mg (como Amlodipino besilato: 6,935 mg);
Excipientes c.s.p. un comprimido recubierto.

TRIPLIXAM® 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg
Son comprimidos recubiertos blancos, oblongos, grabados con en una cara y con 4 en la otra cara.
Fórmula:
Perindopril arginina: 10 mg (equivalentes a 6,790 mg de Perindopril);
Indapamida: 2,5 mg;
Amlodipino: 5 mg (como Amlodipino besilato: 6,935 mg);
Excipientes c.s.p. un comprimido recubierto.

TRIPLIXAM® 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg
Son comprimidos recubiertos blancos, oblongos, grabados con en una cara y con 6 en la otra cara.
Fórmula:
Perindopril arginina: 10 mg (equivalentes a 6,790 mg de Perindopril);
Indapamida: 2,5 mg;
Amlodipino: 10 mg (como Amlodipino besilato: 13,870 mg);
Excipientes c.s.p. un comprimido recubierto.

Contenido del prospecto:
1. Qué es TRIPLIXAM® y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar TRIPLIXAM®.
3. Cómo tomar TRIPLIXAM®.
4. Reacciones adversas.
5. Advertencias.
6. Conservación.
7. Presentaciones.

1.Qué es TRIPLIXAM® y para qué se utiliza:

Triplixam® es una asociación de tres principios activos: Perindopril, Indapamida y Amlodipino. Es un antihipertensivo y está indicado para el tratamiento de la presión alta (hipertensión).
Los pacientes que ya toman Perindopril/Indapamida como asociación a dosis fijas y Amlodipino en comprimidos separados, pueden tomar en su lugar un

TRIPLIXAM®
136336

comprimido de **Triplixam®** que contiene los tres principios activos a las mismas dosis.
Cada uno de los principios activos disminuye la presión arterial y actúan de manera conjunta para controlar su presión arterial:
- Perindopril pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). Actúa ensanchado los vasos sanguíneos, por lo que su corazón bombeará sangre más fácilmente a través de ellos.
- Indapamida es un diurético (que pertenece a una clase de medicamentos denominados derivados de sulfonamidas con un anillo indol). Los diuréticos aumentan la cantidad de orina producida por los riñones. Sin embargo, Indapamida es diferente de otros diuréticos, ya que sólo produce un leve aumento en la cantidad de orina formada.
- El Amlodipino es un antagonista del Calcio (que pertenece a un grupo de medicamentos llamados dihidropiridinas). Actúa relajando los vasos sanguíneos por lo que la sangre pasa más fácilmente a través de ellos.

2.Qué necesita saber antes de empezar a tomar TRIPLIXAM®:

Contraindicaciones:

No tome Triplixam® si:
- es alérgico al Perindopril o a cualquier otro IECA, a la Indapamida o a cualquier otra sulfonamida, al Amlodipino o a cualquier otra dihidropiridina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento,
- ha experimentado síntomas como respiración sibilante, inflamación de la cara o lengua, picazón intensa o erupciones cutáneas graves con algún tratamiento previo con IECA, o si usted o algún miembro de su familia ha tenido estos síntomas en cualquier otra circunstancia (un trastorno denominado angioedema),
- padece una enfermedad grave del hígado o sufre una afección denominada encefalopatía hepática (enfermedad del cerebro causada por una enfermedad del hígado),
- sospecha que pueda tener una insuficiencia cardíaca descompensada no tratada (retención grave de líquidos, dificultad respiratoria),
- usted tiene en el corazón un estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica) o shock cardiogénico (una enfermedad en la que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo),
- usted sufre de insuficiencia cardíaca después de un ataque al corazón,
- tiene la presión arterial muy baja (hipotensión),
- tiene bajas concentraciones de Potasio en sangre,
- tiene problemas graves de riñón que hacen que el suministro de sangre a los riñones se vea reducido (estenosis de la arteria renal),
- está recibiendo diálisis o algún otro tipo de filtración de la sangre. Dependiendo de la máquina utilizada, puede que **Triplixam®** no sea adecuado para usted,
- tiene problemas moderados de riñón (para dosis de **Triplixam®** que contienen 10mg/2,5mg/5mg y 10mg/2,5mg/10mg),
- está embarazada de más de 3 meses (es mejor también evitar **Triplixam®** en los primeros meses de embarazo (ver sección "Embarazo y lactancia"),
- tiene diabetes o función renal reducida y está siendo tratado con medicamentos antihipertensivos que contienen Aliskiren,
- ha sido tratado o siendo tratado con Sacubitril/Valsartán, un medicamento para la insuficiencia cardíaca, ya que aumenta el riesgo de angioedema (rápida hinchazón bajo la piel en zonas como la garganta) (ver "Precauciones" y "Uso de **Triplixam®** con otros medicamentos").

Precauciones:

Consulte con su médico antes de tomar Triplixam® si:
- padece cardiomiopatía hipertrófica (enfermedad del músculo del corazón) o estenosis de la arteria renal (estrechamiento de la arteria que lleva sangre al riñón),
- padece insuficiencia cardíaca o cualquier otro problema de corazón,
- tiene la prensión arterial muy alta (crisis hipertensiva),
- padece problemas de hígado,
- sufre una enfermedad del colágeno (enfermedad de la piel) como un lupus eritematoso sistémico o esclerodermia,
- padece ateroscleroso (endurecimiento de las arterias),
- tiene que someterse a alguna prueba para comprobar si su glándula paratiroidea funciona correctamente,
- tiene gota,
- tiene diabetes,
- está siguiendo una dieta baja en sal o está utilizando sustitutos de la sal que contengan Potasio (es esencial un nivel equilibrado de Potasio en la sangre),
- está tomando Litio o diuréticos ahorradores de Potasio (Espironolactona, Triamtereno), ya que debe evitarse el uso simultáneo con **Triplixam®** (ver "Uso de **Triplixam®** con otros medicamentos"),
- es un paciente de edad avanzada y necesita que se le aumente su dosis,
- ha tenido reacciones de fotosensibilidad,
- los pacientes de raza negra pueden tener mayor incidencia de angioedema (inflamación de la cara, labios, boca, lengua o garganta que pueden causar dificultad al tragar o respirar) y menos eficacia hipotensora,
- es un paciente dializado por hemodiálisis con membranas de alto flujo,
- padece problemas de riñón, o si está recibiendo diálisis,
- experimenta una disminución de la visión o dolor ocular, podrían ser síntomas de acumulación de líquido en la capa vascular del ojo (derrame coroideo) o un aumento de la presión en el ojo, y se pueden producir entre horas y semanas después de tomar Triplixam (esto puede conducir a una pérdida de visión permanente si no se trata; si anteriormente tuvo alergia a la penicilina o sulfamida, puede tener un mayor riesgo de desarrollarla),

- tiene trastornos musculares, como dolor muscular, dolor a la palpación, debilidad o calambres,
- tiene aumentados anormalmente los niveles de una hormona llamada aldosterona en su sangre (aldosteronismo primario),
- tiene demasiado ácido en la sangre que puede ocasionar un aumento de la frecuencia respiratoria,
- padece insuficiencia cerebrovascular (presión arterial baja en el cerebro),
- tiene inflamación de la cara, labios, boca, lengua o garganta que pueden causar dificultad al respirar (angioedema), que puede aparecer en cualquier momento durante el tratamiento, interrumpa el tratamiento inmediatamente y contacte un médico.
- está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, ya que el riesgo de angioedema es mayor:
  - Racecadotrilo (utilizado para tratar la diarrea),
  - Sirolimus, Everolimus, Temsirolimus y otros medicamentos pertenecientes a la clase de los llamados inhibidores de mTor (usados para evitar el rechazo de órganos trasplantados y para tratar el cáncer),
  - Sacubitril (disponible como asociación a dosis fijas con Valsartán), utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca a largo plazo,
  - Linagliptina, Saxagliptina, Sitagliptina, Vildagliptina y otros medicamentos pertenecientes a la clase de las gliptinas (para tratar la diabetes).
- toma cualquiera de los siguientes medicamentos usados para tratar la hipertensión:
  - un antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA II) (también conocidos como sartanes – por ejemplo Valsartán, Telmisartán, Irbesartán) en particular si padece de problemas de riñón debido a diabetes,
  - Aliskirén.

Su médico podría verificar a intervalos regulares el funcionamiento de sus riñones, su presión arterial y el nivel de electrolitos (por ejemplo: Potasio) en la sangre.
Su médico puede prescribirle análisis de sangre para comprobar si tiene concentraciones bajas de Sodio o Potasio, o concentraciones altas de Calcio.
Ver también la información en la sección "Contraindicaciones".
Debe informar a su médico si cree que está (o podría quedar) embarazada. **Triplixam®** no se recomienda al inicio del embarazo y no debe tomarse después del tercer mes de embarazo, ya que puede causar un daño grave a su hijo si se utiliza en esta etapa (ver sección "Embarazo y lactancia").
Cuando esté tomando **Triplixam®**, debe informar también a su médico o al personal sanitario si:
- va a someterse a anestesia y/o cirugía,
- ha sufrido recientemente diarrea o vómitos, o está deshidratado,
- va a someterse a diálisis o a una aféresis de LDL (eliminación del colesterol de su sangre mediante una máquina),
- va a recibir un tratamiento de desensibilización para reducir los efectos alérgicos a las picaduras de abejas o avispas,
- va a someterse a alguna prueba médica que requiera inyectar un agente de contraste yodado (una sustancia que permite que órganos como el riñón o el estómago sean visibles con rayos X).

Los deportistas deben saber que este medicamento contiene un principio activo que puede dar positivo en las pruebas de control antidopaje.

Niños y adolescentes:

Triplixam® no debe administrarse a niños ni adolescentes.

Uso de Triplixam® con otros medicamentos:
Interacciones medicamentosas:

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento.
No tome **Triplixam®** con Aliskirén (medicamento utilizado para el tratamiento de la hipertensión) si tiene diabetes o problemas de riñón.
Debe evitar tomar **Triplixam®** con:
- Litio (utilizado para tratar trastornos mentales como manía, enfermedad maníaco-depresiva y depresión recurrente),
- Fármacos ahorradores de Potasio (p. ej. Triamtereno, Amiloride), suplementos de Potasio o sustitutos de la sal que contengan Potasio, otros medicamentos que pueden aumentar el Potasio en su cuerpo (como la Heparina, un medicamento utilizado para fluidificar la sangre y evitar coágulos; la trimetoprima y el Cotrimoxazol también conocido como Trimetoprim/Sulfametoxazol, para infecciones causadas por bacterias),
- Dantroleno (perfusión) utilizado también para tratar la hipertermia maligna durante la anestesia (incluyendo síntomas como fiebre muy alta y rigidez muscular),
- Estramustina (utilizado en el tratamiento del cáncer),
- Medicamentos que se utilizan habitualmente para tratar la diarrea (Racecadotrilo) o para evitar el rechazo de órganos trasplantados (Sirolimus, Everolimus, Temsirolimus y otros medicamentos pertenecientes a la clase de los llamados inhibidores de mTor). Ver sección "Precauciones".
- Sacubitril/Valsartán (utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca a largo plazo). Ver las secciones "Contraindicaciones" y "Precauciones".
- otros fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina.

El tratamiento con **Triplixam®** puede verse afectado por otros medicamentos. Su médico podría tener que cambiar su dosis y/o tomar otras precauciones.
Asegúrese de informar a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, ya que puede precisar un cuidado especial:
- otros medicamentos para la presión arterial alta, incluyendo antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II), Aliskirén (ver también la información en la sección "No tome **Triplixam®**" y "Precauciones"), o diuréticos (medicamentos que aumentan la cantidad de orina producida por los riñones),
- fármacos ahorradores de potasio utilizados en el tratamiento de insuficiencia cardíaca: Eplerenona y Espironolactona a dosis de entre 12,5 mg y 50 mg al día,

- medicamentos anestésicos,
- agente de contraste yodado,
- Bepridil (utilizado para el tratamiento de angina de pecho),
- Metadona (utilizado para el tratamiento de la adicción),
- medicamentos para trastornos del ritmo cardíaco (p. ej., Dofetilida, Ibutilida, Bretilium, Cisapride, Difemanilo, Procainamida, Quinidina, Hidroquinidina, Disopiramida, Amiodarona, Sotalol),
- Verapamilo, Diltiazem (medicamentos para el corazón),
- Digoxina u otros glucósidos cardíacos (para el tratamiento de problemas de corazón),
- antibióticos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias (p. ej., Rifampicina, Eritromicina por inyección, Claritromicina, esparfloxacino, moxifloxacino),
- medicamentos antifúngicos (p. ej., Itraconazol, Ketoconazol, Anfotericina B por perfusión IV),
- Allopurinol (para el tratamiento de la gota),
- antihistamínicos utilizados para tratar reacciones alérgicas, tales como la fiebre del heno (p. ej., Mizolastina, Terfenadina, Astemizol),
- corticoesteroides utilizados para tratar diferentes trastornos incluyendo asma grave y artritis reumatoidea y antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, Ibuprofeno) o dosis altas de ácido acetilsalicílico (sustancia presente en muchos medicamentos utilizados para aliviar el dolor y bajar la fiebre, así como para prevenir la formación de coágulos),
- inmunosupresores (medicamentos para controlar la respuesta inmune del cuerpo) para el tratamiento de trastornos autoinmunes o después de un trasplante (por ejemplo, Ciclosporina, Tacrolimus),
- Tetracosactida (para el tratamiento de la enfermedad de Crohn),
- sales de oro, especialmente en administración intravenosa (utilizadas para el tratamiento sintomático de artritis reumatoidea),
- Halofantrina (utilizado para tratar algunos tipos de malaria),
- Baclofeno utilizado para el tratamiento de la rigidez muscular que sucede en enfermedades tales como la esclerosis múltiple,
- medicamentos para el tratamiento de la diabetes tales como la Insulina o Metformina,
- Calcio, incluyendo suplementos de calcio,
- laxantes estimulantes (por ejemplo, Senna),
- medicamentos para el tratamiento del cáncer,
- Vincamina (utilizado para el tratamiento de alteraciones cognitivas sintomáticas en pacientes de edad avanzada incluyendo pérdida de memoria),
- medicamentos utilizados para tratar problemas mentales tales como depresión, ansiedad, esquizofrenia (por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antidepresivos tipo imipramínicos, neurolépticos [como amisulprida, sulpirida, sultoprida, tiaprida, haloperidol, droperidol]),
- Pentamidina (utilizado para el tratamiento de la neumonía),
- Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir (llamados inhibidores de la proteasa utilizados para tratar el HIV),
- Hypericum perforatum (Hierba de San Juan),
- Trimetoprim (para el tratamiento de infecciones),
- medicamentos utilizados para el tratamiento de la presión arterial baja, shock o asma (ej. Efedrina, Noradrenalina o Adrenalina),
- Nitroglicerina y otros nitratos, u otros vasodilatadores, que pueden reducir todavía más la presión arterial.

Toma de Triplixam® con los alimentos y bebidas:

Las personas que están tomando **Triplixam®** no deben consumir pomelo, ni jugo de pomelo. Esto se debe a que el pomelo y el jugo de pomelo pueden dar lugar a un aumento de los niveles en sangre del ingrediente activo Amlodipino, lo que puede causar un aumento impredecible del efecto reductor de la presión arterial de **Triplixam®**.

Embarazo y lactancia:

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

• Embarazo:
Debe informar a su médico si cree que está (o podría quedar) embarazada.
Su médico le aconsejará generalmente que deje de tomar **Triplixam®** antes de quedar embarazada o tan pronto como sepa que está embarazada y le aconsejará tomar otro medicamento en lugar de **Triplixam®**.
Triplixam® no está recomendado al principio del embarazo y no debe tomarse después del tercer mes de embarazo, ya que puede causar un daño grave a su bebé si se utiliza después del tercer mes de embarazo.

• Lactancia:
Informe a su médico si está en período de lactancia o va a comenzar la lactancia. **Triplixam®** no está recomendado para madres en período de lactancia, y su médico puede elegir otro tratamiento para usted si desea amamantar a su hijo, especialmente si su bebé es recién nacido o prematuro.

Conducción y uso de máquinas:

Triplixam® puede afectar a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si los comprimidos le hacen sentirse enfermo, mareado, cansado, o le producen dolor de cabeza, no conduzca ni use maquinaria y consulte con su médico inmediatamente.