

Afus[®]

Fusidato de sodio 2%
UNGÜENTO

ANTIBIÓTICO

Vía tópica dérmica

Afus[®]

Ácido fusídico 2%
CREMA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta reacciones adversas, consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en el prospecto.

Contenido del prospecto.

1. Qué es Afus[®] y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Afus[®].
3. Cómo usar Afus[®].
4. Reacciones adversas.
5. Advertencias.
6. Conservación.
7. Composición y presentaciones.

1. Qué es Afus[®] y para qué se utiliza.

Afus[®] pertenece a un grupo de medicamentos llamados antibióticos que actúan sobre bacterias que causan infecciones de la piel.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

Afus[®] crema se recomienda para el tratamiento de infecciones de la piel causadas por bacterias de la familia de estafilococos o estreptococos.

Afus[®] ungüento está indicado para el tratamiento local de infecciones de la piel, tales como impétigo (afección que causa pequeñas ampollas infectadas y costras en la piel), o eccemas infectados (afección de la piel que cursa con inflamación, enrojecimiento, exudación o costras y picor) y para la desinfección de la piel cuando su médico se lo indique.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Afus[®]

No use Afus[®] crema si es alérgico al Ácido fusídico o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

No use Afus[®] ungüento si es alérgico al Fusidato de sodio o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Precauciones.

Consulte a su médico antes de empezar a usar Afus[®].

Afus[®] crema contiene Alcohol cetosteárilico y Lanolina anhidra los cuales pueden provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) y Butil Hidroxitolueno el cual puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas.

Se ha comunicado la aparición de cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes al ácido fusídico por vía tópica.

Afus[®] no debe aplicarse en los ojos o mucosas. Por ello, debe utilizarse con cuidado cuando se aplica cerca de los ojos. Si entra en contacto con los ojos, lávelos con agua.

Siga las instrucciones de su médico en cuanto a la duración del tratamiento. Como sucede con todos los antibióticos, el uso generalizado o repetido puede aumentar el riesgo de que se produzca una resistencia al antibiótico.

Uso de Afus[®] con otros medicamentos.

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo y lactancia.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Afus[®] puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, debiéndose evitar la aplicación sobre las mamas durante el periodo de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

El tratamiento tópico con **Afus®** no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. Como usar Afus®

Posología y modo de administración:

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico.

Afus® crema:

Aplicaciones tópicas con o sin apósito, una o dos veces al día, después de limpiar el área infectada. Evite aplicarlo en una capa gruesa.

Duración del tratamiento: el tratamiento se limita a una semana.

Afus® ungüento:

Adultos y niños (0-17 años): Aplique cuidadosamente una fina capa de ungüento sobre la zona afectada, previamente limpia, dos o tres veces por día durante un periodo de 7 a 10 días.

Después de cada aplicación, lávese las manos cuidadosamente, a menos que estás tengan que ser tratadas. **Afus® ungüento** no es adecuada para el tratamiento de lesiones maceradas e infiltrantes (lesiones húmedas y profundas) y pliegues cutáneos.

En pacientes de edad avanzada no es necesario modificar la dosis arriba indicada ni tomar otras precauciones adicionales.

Sobredosificación:

Si usa más **Afus®** del que debe: La sobredosis es poco probable.

Si usa más **Afus®** del que debe consulte con su médico.

Si olvido usar Afus®: No utilice una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico.

4. Reacciones adversas.

Al igual que todos los medicamentos **Afus®** puede provocar reacciones adversas, aunque no todas las personas la sufran.

Reacciones adversas poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- reacciones cutáneas locales (incluyendo dermatitis de contacto y eccema)
- erupción cutánea (rash)
- picor (prurito), enrojecimiento de la piel (eritema)
- dolor en el lugar de aplicación (incluyendo sensación de quemazón), irritación en el lugar de aplicación

Reacciones adversas raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- reacciones alérgicas
- conjuntivitis
- hinchazón de cara/ garganta
- urticaria
- ampollas en la piel

Si experimenta reacciones adversas, consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en este prospecto.

5. Advertencias:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños. En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel: 1722.

6. Conservación:

Conservar el pomo bien tapado, a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

7. Composición y presentaciones:

Afus® Ungüento:

Composición:

- El principio activo es Fusidato de sodio: Cada 100 g de ungüento contiene 2,0 g de Fusidato de sodio.
- Los demás componentes son: vaselina líquida, vaselina sólida, alcoholes de lanolina, monoestearato de sorbitán 60.

Presentación: Envases conteniendo un pomo de 15 g.

Afus® Crema:

Composición:

- El principio activo es Ácido fusídico: Cada 100 g de crema contiene 2,0 g de ácido fusídico.
- Los demás componentes son: alcohol cetosteárilico, vaselina líquida, lanolina anhidra, lauril sulfato de sodio, p-Hidroxibenzoato de metilo, butil hidroxil tolueno, agua purificada.

Presentación: Envases conteniendo un pomo de 15 g.

 **Laboratorios**
Antía, Moll & Cía. S.A.

Estero Bellaco 2782 - Montevideo
Industria uruguaya

Contacto: 2487 2450 - atencionalcliente@efa.com.uy
www.efalaboratorios.com.uy